

**Anexo 1.** Catálogo de la familia neotropical Marcgraviaceae (8 géneros, 136 especies). Los nombres en negrita son los aceptados.

*Ascium* Schreber  
= ***Norantea* Aubl.**

*Ascium* Vahl  
= ***Norantea* Aubl.**

*Ascium adamantium* Steud.  
= ***Schwartzia adamantium* (Cambess.) Bedell ex Gir.-Cañas**

*Ascium aubletii* Spreng.  
= ***Norantea guianensis* Aubl.**

*Ascium berteroi* Spreng.  
= ***Schwartzia spiciflora* (A. L. Juss.) Bedell**

*Ascium goyazense* Steud.  
= ***Norantea guianensis* Aubl.**

*Ascium guianense* (Aubl.) Oken  
= ***Norantea guianensis* Aubl.**

*Ascium japurense* Steud.  
= ***Norantea guianensis* Aubl.**

*Ascium norantea* Raeusch  
= ***Norantea guianensis* Aubl.**

*Ascium paraense* Steud.  
= ***Norantea guianensis* Aubl.**

*Ascium selloi* Spreng.  
= ***Schwartzia brasiliensis* (Choisy) Bedell ex Gir.-Cañas**

*Ascium violaceum* Vahl  
= ***Norantea guianensis* Aubl.**

*Caracasia* Szyszyl.  
= ***Ruyschia* Jacq.**

*Caracasia tremadena* (Ernst) Szyszyl.  
= ***Ruyschia tremadena* (Ernst) Lundell**

*Caracasia viridiflora* (Ernst) Szyszyl.  
Nota: quizás sea un sinónimo de ***Ruyschia tremadena* (Ernst) Lundell**

*Jatropha* Rottb.  
= ***Marcgravia* L.**

*Logania* J. F. Gmel. (*non Logania* R. Br., Loganiaceae)  
= ***Souroubea* Aubl.**

*Loghania* Scop.  
= ***Souroubea* Aubl.**

*Loghania pentacrina* Scop.  
= ***Souroubea guianensis* Aubl.**

*Marcgraavia* Griseb.  
= ***Marcgravia* L.**

*Marcgrafia* Gled.  
= ***Marcgravia* L.**

***Marcgravia* L.**  
64 especies.  
Sin.: *Jatropha* Rottb., *Marcgraavia* Griseb., *Marcgrafia* Gled., *Marcgraavia* Griseb., *Marggravia* Willd. (*sensu* Bedell, 1989).

*Marcgravia acuminata* Miq.  
Nota: estatus sin definir.

*Marcgravia affinis* Hemsl.  
= ***Marcgravia caudata* Triana & Planch.**

*Marcgravia ampulligera* Woodson  
= ***Marcgravia brownei* (Triana & Planch.) Krug & Urb.**

*Marcgravia angustifolia* Pav. ex Wittm.  
Nota: estatus sin definir.

*Marcgravia angustifolia* Ruiz & Pav.  
Nota: estatus sin definir.

*Marcgravia apionifera* de Roon (*in sched.*)  
= *Marcgravia roonii* S. Dressler

***Marcgravia atropunctata* de Roon**  
Ref.: A. Gentry & M. Fallen 17830 (COL, MO).  
0-1500 metros de altitud.  
Países: Colombia, Ecuador y Panamá.

***Marcgravia brachysepala* Urb.**  
Ref.: Lens *et al.* (2005).  
0-500 metros de altitud.  
País: Jamaica.  
Nota: especie dudosa y quizás, pueda corresponder a un sinónimo.

*Marcgravia brittoniana* Alain  
= *Marcgravia rectiflora* Triana & Planch.

***Marcgravia brownei* (Triana & Planch.) Krug & Urb.**  
Sin.: *Marcgravia ampulligera* Woodson, *Marcgravia rectiflora* Triana & Planch. var. *brownei* Triana & Planch.  
Ref.: D. Giraldo-Cañas 5027 (COL).  
0-3000 metros de altitud.  
Países: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela.

*Marcgravia cacabifera* Ruiz & Pav. ex E. A. López  
= *Sarcopera anomala* (Kunth) Bedell

***Marcgravia caudata* Triana & Planch.**  
Sin.: *Marcgravia affinis* Hemsl.  
Ref.: D. Giraldo-Cañas 1979-a (COL).  
0-2000 metros de altitud.  
Países: Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá.

***Marcgravia comosa* C. Presl**  
Ref.: Castro Souza (2010).  
0-500 metros de altitud.  
País: Brasil (endémica).

*Marcgravia cordachida* Ruiz & Pav. ex E. A. López  
= *Sarcopera cordachida* (Ruiz & Pav. ex G. Don)  
Bedell ex S. Dressler

***Marcgravia coriacea* Vahl**  
Sin.: *Marcgravia cuspidata* Planch. & Linden ex Triana & Planch., *Marcgravia cuyuniensis* I. W. Bailey, *Marcgravia roraimae* Gilg & Werderm.  
0-2000 metros de altitud.  
Ref.: R. Schnell 11939 (COL).  
Países: Brasil, Guayana Francesa, Guyana, Surinam y Venezuela (probablemente en Colombia y Ecuador).

***Marcgravia crassicostata* Gilg**  
Ref.: Castro Souza (2010).  
0-500 metros de altitud.  
País: Brasil (endémica).

***Marcgravia crassiflora* Sleumer**  
Ref.: Jørgensen y León-Yáñez (1999).  
1000-1500 metros de altitud.  
País: Ecuador (endémica).  
Nota: esta especie solo se conoce del material tipo, el cual es fragmentario y su identidad taxonómica es incierta.

***Marcgravia crenata* Poepp. ex Wittm.**  
Sin.: *Marcgravia crenata* Poepp. ex Wittm. var. *roquensis* J. F. Macbr., *Marcgravia macrophylla* (Wittm.) Gilg, *Marcgravia rectiflora* Triana & Planch. var. *macrophylla* Wittm., *Marcgravia strenua* J. F. Macbr.  
Ref.: J. Espina 2066 (COL).  
0-1000 metros de altitud.  
Países: Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú.

*Marcgravia crenata* Poepp. ex Wittm. var. *roquensis* J. F. Macbr.  
= *Marcgravia crenata* Poepp. ex Wittm.

*Marcgravia cuneifolia* Gardner  
= *Marcgraviastrum cuneifolium* (Gardner) Bedell

*Marcgravia cuspidata* Planch. & Linden ex Triana & Planch.  
= *Marcgravia coriacea* Vahl

*Marcgravia cuyuniensis* I. W. Bailey  
= *Marcgravia coriacea* Vahl

*Marcgravia cyrtogastra* Delpino

Nota: estatus sin definir (quizás sea un sinónimo de *Marcgravia umbellata* L.).

*Marcgravia cyrtonota* Delpino

Nota: estatus sin definir (quizás sea un sinónimo de *Marcgravia coriacea* Vahl).

*Marcgravia dasyantha* Gilg

Ref.: Castro Souza (2010).

0-1000 metros de altitud.

País: Brasil (endémica).

*Marcgravia dasystachya* Gilg ex Ule (nom. nud., Funck *et al.* 2007)

*Marcgravia domingensis* Urb.

Ref.: Dressler (2000), Lens *et al.* (2005).

500-1500 metros de altitud.

Países: Haití y República Dominicana.

*Marcgravia dressleri* Gir.-Cañas

Ref.: R. Galindo 325 (COL).

1000-2000 metros de altitud.

País: Colombia (endémica).

*Marcgravia dubia* Kunth

= *Monstera dubia* (Kunth) Engl. & K. Krause (Araceae)

*Marcgravia eichleriana* Wittm.

Ref.: R. E. Schultes 10105-C (COL).

0-2000 metros de altitud.

Países: Brasil, Colombia y Venezuela.

*Marcgravia elegans* Krug & Urb.

Ref.: Lens *et al.* (2005), Tschapka *et al.* (2006).

500-1500 metros de altitud.

País: Trinidad y Tobago (endémica).

*Marcgravia evenia* Krug & Urb.

Ref.: Lens *et al.* (2005), Schneider *et al.* (2015).

0-1500 metros de altitud.

País: Cuba (endémica).

*Marcgravia flagellaris* (Poepp. ex Wittm.) Gilg & Werderm.

Sin.: *Marcgravia flagellaris* (Poepp. ex Wittm.) Gilg & Werderm. var. *leticiana* J. F. Macbr., *Marcgravia leticiana* (J. F. Macbr.) de Roon, *Marcgravia rectiflora* Triana & Planch. var. *flagellaris* Poepp. ex Wittm., *Marcgravia trinitatis* C. Presl var. *leticiana* (J. F. Macbr.) J. F. Macbr.

Ref.: Lens *et al.* (2005), Castro Souza (2010), Jørgensen *et al.* (2014).

0-1000 metros de altitud.

Países: Bolivia, Brasil, Perú.

*Marcgravia flagellaris* (Poepp. ex Wittm.) Gilg & Werderm. var. *leticiana* J. F. Macbr.

= *Marcgravia flagellaris* (Poepp. ex Wittm.) Gilg & Werderm.

*Marcgravia fosbergiana* J. Ewan

Ref.: J. A. Ewan 16053 (COL, NO, US), estos ejemplares no los he podido localizar; fuente Ewan (1951).

1000-1500 metros de altitud.

País: Colombia

Nota: estatus sin definir y quizás corresponda a un sinónimo de *Marcgravia brownei* (Triana & Planch.) Krug & Urb. (esta especie no fue incluida en los análisis de riqueza).

*Marcgravia gentlei* Lundell

Ref.: Balick *et al.* (2000), Lens *et al.* (2005).

0-500 metros de altitud.

País: Belice (probablemente se le encuentre en Guatemala y Costa Rica).

*Marcgravia glandulosomarginata* Hammel

Ref.: Á. Cogollo 2903 (COL, JAUM, MO).

500-2000 metros de altitud.

Países: Colombia, Costa Rica y Panamá.

*Marcgravia goudotiana* (Triana & Planch.) de Roon

Sin.: *Marcgravia rectiflora* Triana & Planch. var. *goudotiana* Triana & Planch.

1000-1500 metros de altitud.

Nota: estatus sin definir (esta especie no se incluyó en los análisis de riqueza). En los herbarios COL y MO hay una colección de Ecuador (J. L. Clark & P. Conza 3256), la cual fue determinada por S. Dressler (2013) como *Marcgravia goudotiana* (Triana & Planch.) de Roon.

*Marcgravia gracilis* Sagot  
= *Marcgravia pedunculosa* Triana & Planch.

***Marcgravia grandifolia* Sleumer**

Ref.: Jørgensen y León-Yáñez (1999).

0-500 metros de altitud.

País: Ecuador (endémica).

Nota: esta especie solo se conoce del material tipo, el cual es fragmentario y su identidad taxonómica es incierta.

*Marcgravia guatemalensis* Standl.

= *Marcgravia pittieri* Gilg

***Marcgravia hartii* Krug & Urb.**

Ref.: Lens *et al.* (2005), Hokche *et al.* (2008).

0-1000 metros de altitud.

Países: Trinidad y Tobago, y Venezuela.

***Marcgravia helverseniana* S. Dressler & Tschapka**

Ref.: J. L. Clark 8474 (QCNE).

1500-2500 metros de altitud.

País: Ecuador (endémica).

*Marcgravia leticiana* (J. F. Macbr.) de Roon

= *Marcgravia flagellaris* (Poepp. ex Wittm.) Gilg & Werderm.

***Marcgravia lineolata* Krug & Urb.**

Ref.: Bedell (1989), Nicolson (1991), Lens *et al.* (2005).

0-500 metros de altitud.

Países: Dominica, Martinica y Santa Lucía.

***Marcgravia longifolia* J. F. Macbr.**

Ref.: R. E. Schultes 6967 (COL).

0-500 metros de altitud.

Países: Colombia y Perú (posiblemente en Brasil).

*Marcgravia macrocalyptra* Delpino

Nota: estatus sin definir (quizás sea un sinónimo de *Marcgravia umbellata* L.).

*Marcgravia macrocarpa* Pav. ex Wittm.

= *Marcgravia oblongifolia* Ruiz ex Wittm.

*Marcgravia macrocarpa* Ruiz & Pav. ex E. A. López  
= *Marcgraviastrum macrocarpum* (G. Don)  
Bedell ex S. Dressler

*Marcgravia macrocarpa* Sleumer ex Diels

= *Marcgravia oblongifolia* Ruiz ex Wittm.

*Marcgravia macrophylla* (Wittm.) Gilg

= *Marcgravia crenata* Poepp. ex Wittm.

***Marcgravia macroscypha* Gilg & Werderm.**

Ref.: Castro Souza (2010).

0-500 metros de altitud.

País: Brasil (endémica).

***Marcgravia magnibracteata* Lanj. & Heerdt**

Ref.: van Roosmalen (1985).

0-500 metros de altitud.

Países: Guayana Francesa, Guyana y Surinam.

Nota: esta especie fue citada para Colombia por Lens *et al.* (2005: 1060), pero esta es exclusiva de las Guyanas.

***Marcgravia maguirei* de Roon**

Ref.: Dressler (2001), Hokche *et al.* (2008).

1000-2000 metros de altitud.

Países: Brasil, Guayana Francesa y Venezuela.

Nota: esta especie no había sido considerada por Castro Souza (2010) y Ulloa Ulloa *et al.* (2017) en su inventario de las Marcgraviaceae de Brasil.

*Marcgravia membranacea* Standl.

= *Marcgravia nervosa* Triana & Planch.

***Marcgravia mexicana* Gilg**

Ref.: Tschapka y von Helversen (1999), Villaseñor (2016).

0-1000 metros de altitud.

Países: Costa Rica, Guatemala, México y Nicaragua.

*Marcgravia micrantha* Pav. ex Wittm.

Nota: estatus sin definir.

***Marcgravia myriostigma* Triana & Planch.**

Ref.: J. J. Triana s.n. (COL, MPU, P).

0-2000 metros de altitud.

Países: Brasil (Tschapka *et al.*, 2006), Colombia.  
 Nota: esta especie no había sido considerada por Castro Souza (2010) y Ulloa Ulloa *et al.* (2017) en su inventario de las Marcgraviaceae de Brasil.

***Marcgravia nepenthoides* Seem.**

Sin.: *Marcgravia tonduzii* Gilg

Ref.: J. Brand 32 (COL, MO).

0-1000 metros de altitud.

Países: Belice, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua y Panamá.

***Marcgravia nervosa* Triana & Planch.**

Sin.: *Marcgravia membranacea* Standl.

Ref.: D. Giraldo-Cañas 1918-a (COL).

0-2000 metros de altitud.

Países: Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y Panamá.

***Marcgravia neurophylla* Gilg**

Ref.: Lens *et al.* (2005), Castro Souza (2010).

0-1000 metros de altitud.

País: Brasil (endémica).

***Marcgravia nubicola* de Roon**

Ref.: J. Steyermark & V. Carreño Espinoza 123827 (COL, VEN).

1000-2000 metros de altitud.

País: Venezuela (endémica).

***Marcgravia oblongifolia* Ruiz ex Wittm.**

Sin.: *Marcgravia macrocarpa* Pav. ex Wittm.,

*Marcgravia macrocarpa* Sleumer ex Diels

Ref.: Brako & Zarucchi (1993), Jørgensen & León-Yáñez (1999), Jørgensen *et al.* (2014).

500-2000 metros de altitud.

Países: Bolivia, Ecuador y Perú.

*Marcgravia obovata* Ruiz & Pav. ex E. A. López  
 = *Marcgraviastrum obovatum* (G. Don) Bedell ex  
 Gir.-Cañas & S. Dressler

***Marcgravia oligandra* Griseb.**

Ref.: M. Mejía *et al.* 1251 (COL, MO).

500-1500 metros de altitud.

Países: Cuba, Haití y República Dominicana.

***Marcgravia panamensis* S. Dressler**

Ref.: B. E. Hammel 7344 (MO).

0-1000 metros de altitud.

País: Panamá (endémica; posiblemente en Costa Rica).

*Marcgravia parviflora* Rich. ex Wittm.

= *Marcgravia pedunculosa* Triana & Planch.

*Marcgravia parviflora* Rich. ex Wittm. var.  
*macrophylla* Wittm.

= *Marcgravia pedunculosa* Triana & Planch.

*Marcgravia parviflora* Rich. ex Wittm. var. *sprucei*  
 Wittm.

= *Marcgravia sprucei* (Wittm.) Gilg

***Marcgravia patellulifera* de Roon**

Ref.: Dressler (2001), Hokche *et al.* (2008)

0-1000 metros de altitud.

País: Venezuela (endémica).

*Marcgravia pauciflora*

Nota: binomio considerado en Tschapka *et al.*  
 (2006: 386) sin autores; estatus incierto.

*Marcgravia peduncularis* Poepp. ex Rusby  
 = *Schwartzia weddelliana* (Baill.) Bedell

***Marcgravia pedunculosa* Triana & Planch.**

Sin.: *Marcgravia gracilis* Sagot, *Marcgravia parviflora*  
 Rich. ex Wittm., *Marcgravia parviflora* Rich. ex  
 Wittm. var. *macrophylla* Wittm.

Ref.: D. Giraldo-Cañas 2084-a (COL).

0-1500 metros de altitud.

Países: Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana  
 Francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

Nota: esta especie se registra aquí por primera vez  
 para el Perú.

*Marcgravia pentandra* Ruiz & Pav. ex E. A. López  
 = *Ruyschia pavonii* G. Don

***Marcgravia picta* Willd.**

Ref.: Castro Souza (2010).

0-500 metros de altitud.

País: Brasil (endémica).

Nota: entidad taxonómica dudosa.

***Marcgravia pittieri* Gilg**

Sin.: *Marcgravia guatemalensis* Standl.  
 Ref.: Lens *et al.* (2005), Hammel *et al.* (2007).  
 0-1000 metros de altitud.  
 Países: Costa Rica, Guatemala, México y Panamá  
 (probablemente en Nicaragua).

*Marcgravia polyadenia* de Roon (*in sched.*)

***Marcgravia polyadenia* Sleumer**

Ref.: Jørgensen y León-Yáñez (1999).  
 0-500 metros de altitud.  
 País: Ecuador (endémica).  
 Nota: esta especie solo se conoce del material tipo,  
 el cual es fragmentario y su identidad taxonómica  
 es incierta.

***Marcgravia polyantha* Delpino**

Ref.: R. Mello-Silva *et al.* 1581 (COL, SPF, RB).  
 0-2500 metros de altitud.  
 Países: Bolivia y Brasil.

*Marcgravia polyantha* Delpino var. *occidentalis*  
 Wittm.

= *Marcgravia polyantha* Delpino  
 subsp. *occidentalis* (Wittm.) S. Dressler

***Marcgravia punctifolia* S. Dressler**

Ref.: H. Mendoza 10131 (COAH; ejemplar  
 determinado por S. Dressler, 2009)  
 500-1000 metros de altitud.  
 Países: Brasil, Colombia y Venezuela.  
 Nota: aquí se registra por primera vez para  
 Colombia, ya que solo se conocía de Brasil y  
 Venezuela (Dressler, 1998).

***Marcgravia purpurea* I. W. Bailey**

Ref.: J. Pipoly *et al.* 12124 (COL, MO).  
 0-1000 metros de altitud.  
 Países: Bolivia, Brasil, Guayana Francesa, Guyana,  
 Perú, Surinam y Venezuela (posiblemente en  
 Colombia).  
 Nota: esta especie se registra aquí por primera vez  
 para el Perú.

***Marcgravia rectiflora* Triana & Planch.**

Sin.: *Marcgravia brittoniana* Alain, *Marcgravia*

*umbellata* Griseb. (non *Marcgravia umbellata* L.)

Ref.: T. Zanoni *et al.* 25647 (COL, MO).  
 0-1000 metros de altitud.  
 Países: Cuba, Haití, Puerto Rico, República  
 Dominicana y Tortola.  
 Nota: esta especie fue citada para Brasil por Castro  
 Souza (2010), pero esta es exclusiva de las Antillas  
 Mayores (Dressler, 1997).

*Marcgravia rectiflora* Triana & Planch. var. *brownei*  
 Triana & Planch.

= *Marcgravia brownei* (Triana & Planch.) Krug  
 & Urb.

*Marcgravia rectiflora* Triana & Planch. var. *flagellaris*  
 Poepp. ex Wittm.

= *Marcgravia flagellaris* (Poepp. ex Wittm.) Gilg  
 & Werderm.

*Marcgravia rectiflora* Triana & Planch. var.  
*goudotiana* Triana & Planch.

= *Marcgravia goudotiana* (Triana & Planch.) de  
 Roon

*Marcgravia rectiflora* Triana & Planch. var. *jacquinii*  
 Triana & Planch.

= *Marcgravia trinitatis* C. Presl

*Marcgravia rectiflora* Triana & Planch. var.  
*macrophylla* Wittm.

= *Marcgravia crenata* Poepp. ex Wittm.

*Marcgravia reticulata* de Roon (*in sched.*)

***Marcgravia roonii* S. Dressler**

Sin.: *Marcgravia apionifera* de Roon (*in sched.*)  
 Ref.: E. P. Killip 34790 (COL).  
 0-2000 metros de altitud.

Países: Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá.

*Marcgravia roraimae* Gilg & Werderm.

= *Marcgravia coriacea* Vahl

*Marcgravia roraimensis* Gilg ex Ule (*nom. nud.*,  
 Funck *et al.*, 2007) xxx

***Marcgravia rubra* Alain**

Ref.: M. Mejía & J. Pimentel 18270 (COL, MO).  
500-1500 metros de altitud.  
País: República Dominicana (endémica).

***Marcgravia salicifolia* Gilg**

Ref.: Castro Souza (2010).  
0-500 metros de altitud.  
País: Brasil (endémica).

***Marcgravia schippii* Standl.**

Ref.: Balick *et al.* (2000), Correa *et al.* (2004), Lens *et al.* (2005).  
0-1500 metros de altitud.  
Países: Belice, Costa Rica, Guatemala y Panamá (probablemente en Nicaragua).

***Marcgravia serrae* de Roon**

Ref.: Tschapka y von Helversen (1999), Correa *et al.* (2004), Hammel *et al.* (2007).  
0-3000 metros de altitud.  
Países: Costa Rica y Panamá.

***Marcgravia sintenisii* Urb.**

Ref.: B. Boom & C. Rivera 6809 (COL, MO).  
500-1500 metros de altitud.  
País: Puerto Rico (endémica).

***Marcgravia sororopaniana* Steyererm.**

Sin.: *Marcgravia steyermarkii* de Roon  
Ref.: H. D. Clarke *et al.* 10449 (COL, US).  
0-2500 metros de altitud.  
Países: Brasil, Guayana Francesa, Guyana y Venezuela.  
Nota: esta especie no había sido considerada por Castro Souza (2010) en su inventario de Marcgraviaceae de Brasil.

*Marcgravia spiciflora* A. L. Juss.  
= *Schwartzia spiciflora* (A. L. Juss.) Bedell

***Marcgravia sprucei* (Wittm.) Gilg**

Sin.: *Marcgravia parviflora* Rich. ex Wittm. var. *sprucei* Wittm.  
Ref.: J. Cuatrecasas 7227 (COL).  
0-1000 metros de altitud.  
Países: Brasil, Colombia, Perú y Venezuela.

***Marcgravia stenonectaria* Gilg**

Ref.: Castro Souza (2010).  
0-500 metros de altitud.  
País: Brasil (endémica).

*Marcgravia steyermarkii* de Roon  
= *Marcgravia sororopaniana* Steyererm.

***Marcgravia stonei* Utley**

Ref.: Lens *et al.* (2005), Tschapka *et al.* (2006), Villaseñor (2016).  
1000-2000 metros de altitud.  
País: México (endémica); citada para Costa Rica por Ulloa Ulloa *et al.* (2017), pero esta es endémica de México.

*Marcgravia strenua* J. F. Macbr.  
= *Marcgravia crenata* Poepp. ex Wittm.

***Marcgravia subcaudata* Gilg & Werderm.**

Ref.: Jørgensen y León-Yáñez (1999), Castro Souza (2010).  
0-500 metros de altitud.  
Países: Brasil y Ecuador.

***Marcgravia tobagensis* Urb.**

Ref.: Lens *et al.* (2005), Hokche *et al.* (2008).  
0-1500 metros de altitud.  
Países: Trinidad y Tobago, y Venezuela.

*Marcgravia tonduzii* Gilg  
= *Marcgravia nepenthoides* Seem.

***Marcgravia trianae* Baill.**

Ref.: Dressler (2000), Lens *et al.* (2005), Hokche *et al.* (2008).  
1000-3000 metros de altitud.  
País: Venezuela (endémica).

***Marcgravia trinitatis* C. Presl**

Sin.: *Marcgravia rectiflora* Triana & Planch. var. *jacquinii* Triana & Planch.  
Ref.: Bedell (1989), Dressler (1997), Lens *et al.* (2005).  
0-500 metros de altitud.  
Países: Dominica, Guadalupe, Martinica, Santa Lucía, Trinidad y Tobago.

Nota: esta especie fue citada para Brasil por (Castro Souza, 2010) y Ulloa Ulloa *et al.* (2017), pero esta es exclusiva de las Antillas Menores (Dressler, 1997).

*Marcgravia trinitatis* C. Presl var. *leticiana* (J. F. Macbr.) J. F. Macbr.

= *Marcgravia flagellaris* (Poepp. ex Wittm.) Gilg & Werderm.

*Marcgravia umbellata* Griseb.

= *Marcgravia rectiflora* Triana & Planch. (según Acevedo-Rodríguez, 2005).

*Marcgravia umbellata* L.

Ref.: Bedell (1989), Nicolson (1991), Lens *et al.* (2005), Schneider *et al.* (2015).

0-500 metros de altitud.

Países: Antigua, Dominica, Grenada, Guadalupe, Martinica, Monserrate, Saba, Santa Lucía y St. Vincent.

Nota: esta especie fue citada para Brasil por Castro Souza (2010) y Ulloa Ulloa *et al.* (2017), y para Colombia y Guyana por Nicolson (1991), pero esta es exclusiva de las Antillas Menores (Bedell, 1989).

*Marcgravia waferi* Standl.

Ref.: Hammel *et al.* (2007).

0-1000 metros de altitud.

País: Costa Rica (endémica).

*Marcgravia weberbaueri* Gilg

Ref.: D. D. Soejarto 3504 (COL).

500-2000 metros de altitud.

Países: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

*Marcgravia williamsii* J. F. Macbr.

Ref.: E. P. Killip 39100 (COL).

0-1500 metros de altitud.

Países: Brasil, Colombia y Perú (posiblemente en Ecuador).

*Marcgravia yukunorum* Picca & Gir.-Cañas xxx

Ref.: E. Álvarez 1104 (COAH, COL, JAUM).

0-500 metros de altitud.

País: Colombia (endémica).

*Marcgravia zonopunctata* S. Dressler

Ref.: G. A. Black 46-339 (IAN), ejemplar no visto,

fuelle Dressler (2000).

0-500 metros de altitud.

Países: Brasil, Colombia.

Nota: esta especie no había sido considerada por Castro Souza (2010) y Ulloa Ulloa *et al.* (2017) en su inventario de las Marcgraviaceae de Brasil.

*Marggravia* Willd.

= *Marcgravia* L.

*Marcgraviastrum* (Wittm. ex Szyszyl.) de Roon & S. Dressler

14 especies.

*Marcgraviastrum apaporensis* de Roon & Bedell

Ref.: R. E. Schultes 14589 (COL, US).

0-500 metros de altitud.

País: Colombia (endémica).

*Marcgraviastrum cuneifolium* (Gardner) Bedell

Sin.: *Marcgravia cuneifolia* Gardner, *Norantea cuneifolia* (Gardner) Delpino

Ref.: C. Correia 23 (COL, NY, SP)

500-1500 metros de altitud.

País: Brasil (endémica).

*Marcgraviastrum delpinianum* (Wittm.) Gir.-Cañas

Sin.: *Norantea delpiniana* Wittm.

Ref.: E. P. Heringer 1158 (COL, SP).

0-500 metros de altitud.

País: Brasil (endémica).

*Marcgraviastrum elegans* de Roon & Bedell ex Gir.-Cañas & S. Dressler

Ref.: J. L. Zarucchi 2210 (COL, US).

0-500 metros de altitud.

País: Colombia (endémica).

*Marcgraviastrum gigantophyllum* (Gilg) Bedell ex S. Dressler

Sin.: *Norantea gigantophylla* Gilg

Ref.: J. Luteyn 10672 (JAUM, NY).

0-1500 metros de altitud.

Países: Colombia, Ecuador.

*Marcgraviastrum glossostipum* de Roon & Bedell

Ref.: E. André 4682 (F, K, NY).



Sin datos de altitud.

País: Ecuador (endémica) (posiblemente en Colombia).

***Marcgraviastrum grandiflorum* de Roon & Bedell**

Ref.: G. Tessmann 4699 (MO, NY, US).

0-500 metros de altitud.

País: Perú (endémica).

***Marcgraviastrum macrocarpum* (G. Don) Bedell ex S. Dressler**

Sin.: *Marcgravia macrocarpa* Ruiz & Pav. ex E. A. López, *Norantea eoetvoesorum* V. A. Richt., *Norantea macrocarpa* G. Don, *Norantea pardoana* Weberb. & Gilg

Ref.: D. Giraldo-Cañas 6001 (COL).

1000-3000 metros de altitud.

Países: Colombia, Ecuador y Perú.

***Marcgraviastrum mixtum* (Triana & Planch.) Bedell**

Sin.: *Marcgraviastrum pendulum* (Lanj. & Heerdt) Bedell (**syn. nov.**), *Norantea curva* J. F. Macbr., *Norantea mixta* Triana & Planch., *Norantea peduncularis* Poepp. ex Wittm., *Norantea pendula* Lanj. & Heerdt, *Norantea uleana* Pilg.

Ref.: D. Giraldo-Cañas 3306 (COL).

0-2500 metros de altitud.

Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

***Marcgraviastrum obovatum* (G. Don) Bedell ex Gir.-Cañas & S. Dressler**

Sin.: *Marcgravia obovata* Ruiz & Pav. ex E. A. López, *Norantea macroscypha* Gilg, *Norantea obovata* G. Don

Ref.: Giraldo-Cañas y Dressler (2012).

1000-1500 metros de altitud.

País: Perú (endémica) (probablemente se le encuentre en Ecuador).

***Marcgraviastrum pauciflorum* de Roon & Bedell**

Ref.: A. Gentry 40737 (COL, MO).

0-2000 metros de altitud.

Países: Colombia, Panamá; esta especie fue citada para Costa Rica por Ulloa Ulloa *et al.* (2017), pero esta es exclusiva de Colombia y Panamá.

*Marcgraviastrum pendulum* (Lanj. & Heerdt) Bedell (**syn. nov.**)

= *Marcgraviastrum mixtum* (Triana & Planch.) Bedell

***Marcgraviastrum sodiroi* (Gilg) Bedell ex S. Dressler**

Sin.: *Norantea sodiroi* Gilg

Ref.: D. Giraldo-Cañas 1937-a (COL).

0-2000 metros de altitud.

Países: Colombia y Ecuador.

***Marcgraviastrum subsessile* (Benth.) Bedell**

Sin.: *Norantea albido-rosea* Gilg, *Norantea subsessilis* (Benth.) Donn. Sm., *Ruyschia subsessilis* Benth.

Ref.: E. Forero *et al.* 4412 (COL).

0-1500 metros de altitud.

Países: Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Panamá.

***Marcgraviastrum vogelii* de Roon & Bedell**

Ref.: L. E. Mora 4148 (COL).

500-2000 metros de altitud.

País: Colombia (endémica) (probablemente se le encuentre en Ecuador y Panamá).

***Norantea Aubl.***

Una especie.

Sin.: *Ascium* Schreber, *Ascium* Vahl

*Norantea adamantium* Cambess.

= *Schwartzia adamantium* (Cambess.) Bedell ex Gir.-Cañas

*Norantea albido-rosea* Gilg

= *Marcgraviastrum subsessile* (Benth.) Bedell

*Norantea anomala* Kunth

= *Sarcopera anomala* (Kunth) Bedell

*Norantea aurantiaca* Spruce ex Gilg & Werderm.

= *Sarcopera aurantiaca* (Spruce ex Gilg & Werderm.) de Roon & S. Dressler

*Norantea bahiensis* Mart. ex Wittm., *nomen nudum*.

= *Schwartzia brasiliensis* (Choisy) Bedell ex Gir.-Cañas

*Norantea berteroi* (Spreng.) G. Don.  
= *Schwartzia spiciflora* (A. L. Juss.) Bedell

*Norantea brachystachya* (Rusby) de Roon  
= *Souroubea brachystachya* Rusby

*Norantea brasiliensis* Choisy  
= *Schwartzia brasiliensis* (Choisy) Bedell ex Gir.-  
Cañas

*Norantea brenesii* Standl.  
= *Schwartzia brenesii* (Standl.) Bedell

*Norantea cacabifera* Ruiz & Pav. ex G. Don  
= *Sarcopera anomala* (Kunth) Bedell

*Norantea caccabion* Delpino  
= *Sarcopera cordachida* (Ruiz & Pav. ex G. Don)  
Bedell ex S. Dressler

*Norantea coccinea* de Roon, in Punt, Pollen  
morphology of the genera *Norantea*, *Souroubea* and  
*Ruyschia* (Marcgraviaceae). *Pollen et Spores*, 13(2),  
200. 1971, *nomen nudum*.

*Norantea cordachida* Ruiz & Pav. ex G. Don  
= *Sarcopera cordachida* (Ruiz & Pav. ex G. Don)  
Bedell ex S. Dressler

*Norantea cuneifolia* (Gardner) Delpino  
= *Marcgraviastrum cuneifolium* (Gardner) Bedell

*Norantea curva* J. F. Macbr.  
= *Marcgraviastrum mixtum* (Triana & Planch.)  
Bedell

*Norantea delpiniana* Wittm.  
= *Marcgraviastrum delpinianum* (Wittm.) Gir.-  
Cañas

*Norantea droseriformis* Rusby ex Gilg & Werderm.  
= *Sarcopera anomala* (Kunth) Bedell

*Norantea eoetvoesorum* Al. Richt.  
= *Marcgraviastrum macrocarpum* (G. Don)  
Bedell ex S. Dressler

*Norantea eoetvoesorum* V. A. Richt.  
= *Marcgraviastrum macrocarpum* (G. Don)  
Bedell ex S. Dressler

*Norantea gigantophylla* Gilg  
= *Marcgraviastrum gigantophyllum* (Gilg) Bedell  
ex S. Dressler

*Norantea glossostipa* de Roon, in Punt, Pollen  
morphology of the genera *Norantea*, *Souroubea* and  
*Ruyschia* (Marcgraviaceae). *Pollen et Spores*, 13(2),  
201. 1971, *nomen nudum*.

*Norantea goyasensis* Cambess.  
= *Norantea guianensis* Aubl.

*Norantea gracilis* (Wittm.) V. A. Richt.  
= *Norantea guianensis* Aubl.

*Norantea grandiflora* de Roon, in Punt, Pollen  
morphology of the genera *Norantea*, *Souroubea* and  
*Ruyschia* (Marcgraviaceae). *Pollen et Spores*, 13(2),  
201. 1971, *nomen nudum*.

#### *Norantea guianensis* Aubl.

Sin.: *Ascium aubletii* Spreng., *Ascium goyazense*  
Steud., *Ascium guianense* (Aubl.) Oken, *Ascium*  
*japurense* Steud., *Ascium norantea* Raeusch, *Ascium*  
*paraense* Steud., *Ascium violaceum* Vahl, *Norantea*  
*goyasensis* Cambess., *Norantea gracilis* (Wittm.) V.  
A. Richt., *Norantea guianensis* Aubl. var. *goyasensis*  
(Cambess.) G. L. Ferreira, *Norantea guianensis* Aubl.  
var. *gracilis* Wittm., *Norantea japurense* Mart.,  
*Norantea paraensis* Mart., *Norantea zelodoniana*  
Standl. & L. O. Williams  
Ref.: D. Giraldo-Cañas 2164 (COL, MO).

0-2000 metros de altitud.

Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica  
(cultivada), Ecuador, Guayana Francesa, Guyana,  
Hawaii (EE.UU., cultivada), Jamaica (cultivada),  
Monserrate (cultivada), Perú, Surinam, Trinidad y  
Tobago, y Venezuela.

*Norantea guianensis* Aubl. var. *goyasensis*  
(Cambess.) G. L. Ferreira  
= *Norantea guianensis* Aubl.

*Norantea guianensis* Aubl. var. *gracilis* Wittm.  
= *Norantea guianensis* Aubl.

*Norantea haematoscypha* Gilg.  
= *Pseudosarcopera oxystylis* (Baill.) Gir.-Cañas

*Norantea ignescens* de Roon, in Punt, Pollen morphology of the genera *Norantea*, *Souroubea* and *Ruyschia* (Marcgraviaceae). *Pollen et Spores*, 13(2), 201. 1971, *nomen nudum*.

*Norantea indica* Sweet, Sweet's Hort. Brit., ed. 2: 79. 1830, *nomen nudum*. Este binomio quizás corresponda a la misma *N. guianensis* Aubl. (Bedell, 1985).

*Norantea japurensis* Mart.  
= *Norantea guianensis* Aubl.

*Norantea jimenezii* (Standl.) de Roon  
= *Schwartzia jimenezii* (Standl.) Bedell

*Norantea jussiaei* Triana & Planch.  
= *Schwartzia spiciflora* (A. L. Juss.) Bedell

*Norantea loczyi* V. A. Richt.  
= *Souroubea loczyi* (V. A. Richt.) de Roon

*Norantea macrocarpa* G. Don  
= *Marcgraviastrum macrocarpum* (G. Don) Bedell ex S. Dressler

*Norantea macrocephala* G. Don, *in sched.*

*Norantea macroscypha* Gilg  
= *Marcgraviastrum obovatum* (G. Don) Bedell ex Gir.-Cañas & S. Dressler

*Norantea macrostoma* Gilg  
= *Schwartzia weddelliana* (Baill.) Bedell

*Norantea magnifica* Gilg  
= *Schwartzia magnifica* (Gilg) Bedell

*Norantea microscypha* Gilg  
= *Sarcopera anomala* (Kunth) Bedell

*Norantea mixta* Triana & Planch.  
= *Marcgraviastrum mixtum* (Triana & Planch.) Bedell

*Norantea obovata* G. Don  
= *Marcgraviastrum obovatum* (G. Don) Bedell ex Gir.-Cañas & S. Dressler

*Norantea oxystylis* Baill.  
= *Pseudosarcopera oxystylis* (Baill.) Gir.-Cañas

*Norantea paraensis* Mart.  
= *Norantea guianensis* Aubl.

*Norantea pardoana* Weberb. & Gilg  
= *Marcgraviastrum macrocarpum* (G. Don) Bedell ex S. Dressler

*Norantea peduncularis* Poepp. ex Wittm.  
= *Marcgraviastrum mixtum* (Triana & Planch.) Bedell

*Norantea pendula* Lanj. & Heerdt  
= *Marcgraviastrum mixtum* (Triana & Planch.) Bedell

*Norantea robusta* de Roon, in Punt, Pollen morphology of the genera *Norantea*, *Souroubea* and *Ruyschia* (Marcgraviaceae). *Pollen et Spores*, 13(2), 201. 1971, *nomen nudum*.

*Norantea rosulata* (de Roon & Bedell) Hammell (inédito)  
= *Sarcopera rosulata* de Roon & Bedell

*Norantea sandiensis* Gilg  
= *Schwartzia weddelliana* (Baill.) Bedell

*Norantea selloi* (Spreng.) G. Don  
= *Schwartzia brasiliensis* (Choisy) Bedell ex Gir.-Cañas

*Norantea sessiliflora* Triana & Planch.  
= *Sarcopera sessiliflora* (Triana & Planch.) Bedell

*Norantea sessilis* L. O. Williams  
= *Sarcopera sessiliflora* (Triana & Planch.) Bedell

*Norantea sodiroi* Gilg  
= *Marcgraviastrum sodiroi* (Gilg) Bedell ex S. Dressler

*Norantea spiciflora* (A. L. Juss.) Krug & Urb.  
= *Schwartzia spiciflora* (A. L. Juss.) Bedell

*Norantea subsessilis* (Benth.) Donn. Sm.  
= *Marcgraviastrum subsessile* (Benth.) Bedell

*Norantea tepuiensis* de Roon  
= *Sarcopera tepuiensis* (de Roon) Bedell

*Norantea thyrsoflora* Gilg, *nomen nudum*.

*Norantea uleana* Pilg.  
= *Marcgraviastrum mixtum* (Triana & Planch.) Bedell

*Norantea weddelliana* Baill.  
= *Schwartzia weddelliana* (Baill.) Bedell

*Norantea zahlbruckneri* V. A. Richt.  
= *Sarcopera anomala* (Kunth) Bedell

*Norantea zelodoniana* Standl. & L. O. Williams  
= *Norantea guianensis* Aubl.

***Pseudosarcopera* Gir.-Cañas**  
Dos especies.

***Pseudosarcopera diaz-piedrahitae* (Gir.-Cañas) Gir.-Cañas**  
Sin.: *Schwartzia colombiana* de Roon & Bedell, *Schwartzia diaz-piedrahitae* Gir.-Cañas  
Ref.: M. Monsalve 484 (COL, JAUM, MO, NY).  
0-500 metros de altitud.  
Países: Colombia y Ecuador.

***Pseudosarcopera oxystylis* (Baill.) Gir.-Cañas**  
Sin.: *Norantea haematoscypha* Gilg., *Norantea oxystylis* Baill., *Sarcopera oxystylis* (Baill.) Bedell ex Gir.-Cañas  
Ref.: P. Acevedo-Rodríguez et al. 6609 (NY, US).  
1500-3000 metros de altitud.  
Países: Bolivia y Perú.

***Ruyschia* Jacq.**  
Nueve especies.  
Sin.: *Caracasia* Szyszyl., *Vargasia* Ernst

*Ruyschia amazonica* Mart.  
= *Souroubea guianensis* Aubl.

*Ruyschia amazonica* Mart. var. *dilatata* Triana & Planch.  
= *Souroubea sympetala* Gilg

***Ruyschia andina* de Roon**  
Ref.: D. N. Smith et al. 13915 (MO, SI).  
1500-2500 metros de altitud.  
Países: Bolivia, Ecuador y Perú.

*Ruyschia bicolor* Benth.  
= *Souroubea bicolor* (Benth.) de Roon

***Ruyschia clusiifolia* Jacq.**  
Sin.: *Ruyschia cymbadenia* Delpino, *Ruyschia fragrans* Moritz ex Wittm., *Ruyschia laurifolia* C. Presl  
Ref.: Bedell (1989), Nicolson (1991), de Roon (2005), Lens et al. (2005).  
0-500 metros de altitud.  
Países: Dominica, Guadalupe, Martinica, Trinidad y Tobago.

*Ruyschia corallina* Mart.  
= *Souroubea corallina* (Mart.) de Roon

*Ruyschia crassipes* Triana & Planch.  
= *Souroubea crassipes* (Triana & Planch.) Wittm.

*Ruyschia cymbadenia* Delpino  
= *Ruyschia clusiifolia* Jacq.

***Ruyschia enervia* Lundell**  
Sin.: *Ruyschia longistylis* Standl. & Steyererm.  
Ref.: Balick et al. (2000), de Roon (2005), Hammel et al. (2007).  
0-1000 metros de altitud.  
Países: Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras y México.

*Ruyschia fragrans* Moritz ex Wittm.

= *Ruyschia clusiifolia* Jacq.

Nota: binomio considerado por Philipson (1956) en la sinonimia de *Ruyschia zulueta* Philipson [= *Ruyschia tremadena* (Ernst) Lundell], pero este no ha sido publicado válidamente.

*Ruyschia guianensis* (Aubl.) Vitman

= *Souroubea guianensis* Aubl.

*Ruyschia jimenezii* Standl.

= *Schwartzia jimenezii* (Standl.) Bedell

*Ruyschia laurifolia* C. Presl

= *Ruyschia clusiifolia* Jacq.

*Ruyschia lepidota* Miq.

= *Souroubea guianensis* Aubl.

*Ruyschia longistylis* Standl. & Steyerem.

= *Ruyschia enervia* Lundell

*Ruyschia mexicana* Baillon

= *Souroubea exauriculata* Delpino

*Ruyschia moralesii* Hammel

Ref.: Hammel (2006).

1000-2000 metros de altitud.

País: Costa Rica (endémica).

Nota: esta especie no fue considerada por Ulloa Ulloa *et al.* (2017), en su catálogo de las Américas.

*Ruyschia pavonii* G. Don

Sin.: *Marcgravia pentandra* Ruiz & Pav. ex E. A. López, *Ruyschia sphaeradenia* Delpino

Ref.: D. Sánchez 567 (COL).

1500-2500 metros de altitud.

Países: Colombia y Perú.

*Ruyschia phylladenia* Sandwith

Ref.: A. Gentry *et al.* 16892 (COL, MO).

0-2000 metros de altitud.

Países: Costa Rica y Panamá.

*Ruyschia pilophora* Triana & Planch.

Sin.: *Souroubea pileata* Delpino, *Souroubea pilophora* (Triana & Planch.) Wittm.

Ref.: D. Giraldo-Cañas 4964 (COL).

1500-3000 metros de altitud.

Países: Bolivia y Colombia

Nota: de Roon (2005) la consideró endémica de Colombia, pero recientemente se citó para Bolivia (Jørgensen *et al.*, 2014; Ulloa Ulloa *et al.*, 2017).

*Ruyschia platyadenia* Gilg

= *Souroubea platyadenia* (Gilg) de Roon

*Ruyschia souroubea* Sw.

= *Souroubea guianensis* Aubl.

*Ruyschia sphaeradenia* Delpino

= *Ruyschia pavonii* G. Don

*Ruyschia subsessilis* Benth.

= *Marcgraviastrum subsessile* (Benth.) Bedell

*Ruyschia tremadena* (Ernst) Lundell

Sin.: *Caracasia tremadena* (Ernst) Szyszyl., *Ruyschia zulueta* Philipson, *Vargasia tremadena* Ernst.

Posibles sinónimos: *Caracasia viridiflora* (Ernst) Szyszyl., *Vargasia viridiflora* Ernst

Ref.: C. Rojas & Y. León CHR-24 (COL, MERC).

0-2500 metros de altitud.

Países: Colombia, Panamá y Venezuela.

*Ruyschia valerioi* Standl.

Ref.: B. E. Hammel & I. Pérez 23787 (MO).

500-1500 metros de altitud.

País: Costa Rica (endémica).

*Ruyschia zulueta* Philipson

= *Ruyschia tremadena* (Ernst) Lundell

*Sarcopera* Bedell

Siete especies.

*Sarcopera anomala* (Kunth) Bedell

Sin.: *Marcgravia cacabifera* Ruiz & Pav. ex E. A. López, *Norantea anomala* Kunth, *Norantea cacabifera* Ruiz & Pav. ex G. Don, *Norantea droseriformis* Rusby ex Gilg & Werderm., *Norantea microscypha* Gilg, *Norantea zahlbruckneri* V. A. Richt.

Ref.: D. Giraldo-Cañas 2131-a (COL).

0-2500 metros de altitud.

Países: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

*Sarcopera atrovinosa* de Roon & Bedell  
Nota: binomio no publicado (Bedell 1985: 255) y quizás corresponda a *Sarcopera aurantiaca* (Spruce ex Gilg & Werderm.) de Roon & S. Dressler.

***Sarcopera aurantiaca* (Spruce ex Gilg & Werderm.) de Roon & S. Dressler**

Sin.: *Norantea aurantiaca* Spruce ex Gilg & Werderm.

Ref.: D. Giraldo-Cañas 4576 (COL).

0-500 metros de altitud.

Países: Brasil y Colombia (probablemente se le encuentre en la Amazonia de Venezuela).

*Sarcopera coccinea* de Roon & Bedell  
Nota: binomio no publicado (Bedell 1985: 263), el cual fue considerado posteriormente en forma válida como una subespecie [*Sarcopera tepuiensis* (de Roon) Bedell subsp. *coccinea* de Roon & S. Dressler].

***Sarcopera cordachida* (Ruiz & Pav. ex G. Don) Bedell ex S. Dressler**

Sin.: *Marcgravia cordachida* Ruiz & Pav. ex E. A. López, *Norantea caccabion* Delpino, *Norantea cordachida* Ruiz & Pav. ex G. Don

Ref.: D. Giraldo-Cañas 4631 (COL).

0-1500 metros de altitud.

Países: Colombia y Ecuador.

***Sarcopera flammifera* de Roon & Bedell**

Ref.: B. Maguire & C. Maguire 40104 (NY).

0-2000 metros de altitud.

Países: Brasil y Venezuela.

*Sarcopera oxystylis* (Baill.) Bedell ex Gir.-Cañas  
= *Pseudosarcopera oxystylis* (Baill.) Gir.-Cañas

***Sarcopera rosulata* de Roon & Bedell**

Sin.: *Norantea rosulata* (de Roon & Bedell) Hammell (inédito)

Ref.: R. Callejas 8732 (HUA, NY).

0-2000 metros de altitud.

Países: Colombia, Costa Rica y Panamá (posiblemente en Ecuador).

***Sarcopera sessiliflora* (Triana & Planch.) Bedell**  
Sin.: *Norantea sessiliflora* Triana & Planch., *Norantea sessilis* L. O. Williams

Ref.: J. Idrobo 1418 (COL, US).

0-1500 metros de altitud.

Países: Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Panamá.

***Sarcopera tepuiensis* (de Roon) Bedell**

Sin.: *Norantea tepuiensis* de Roon

Ref.: J. Wurdack 34353 (NY, US).

500-2000 metros de altitud.

Países: Brasil, Guyana y Venezuela.

***Schwartzia* Vell.**

19 especies.

***Schwartzia adamantium* (Cambess.) Bedell ex Gir.-Cañas**

Sin.: *Ascium adamantium* Steud., *Norantea adamantium* Cambess.

Ref.: B. Pereira & D. Alvarenga 2632 (COL, IBGE).

500-1500 metros de altitud.

País: Brasil (endémica).

***Schwartzia andina* Gir.-Cañas**

Ref.: R. Callejas 11073 (COL, HUA, MO).

1500-2500 metros de altitud.

País: Colombia (endémica).

***Schwartzia antioquiensis* Gir.-Cañas**

Sin.: *Schwartzia sclerophylla* de Roon & Bedell, *nom. nud.*

Ref.: R. Fonnegra 5569 (COL, HUA, MO).

1000-2000 metros de altitud.

País: Colombia (endémica).

***Schwartzia brasiliensis* (Choisy) Bedell ex Gir.-Cañas**

Sin.: *Ascium selloi* Spreng., *Norantea bahiensis* Mart. ex Wittm. (*nomen nudum*), *Norantea brasiliensis* Choisy, *Norantea selloi* (Spreng.) G. Don, *Schwartzia glabra* Vell.

Ref.: G. Eiten & W. Clayton 6186 (MO, NY, SP).

0-1000 metros de altitud.

País: Brasil (endémica).

***Schwartzia brenesii* (Standl.) Bedell**

Sin.: *Norantea brenesii* Standl.  
 Ref.: A. M. Brenes 11384 (CR, F).  
 500-1500 metros de altitud.  
 País: Costa Rica (endémica).

***Schwartzia chocoensis* Gir.-Cañas**

Sin.: *Schwartzia foreroi* de Roon & Bedell, *nom. nud.*  
 Ref.: E. Forero 3000 (CHOCO, COL, MO).  
 0-2000 metros de altitud.  
 Países: Colombia y Ecuador.

*Schwartzia colombiana* de Roon & Bedell  
 = *Pseudosarcopera diaz-piedrahitae* (Gir.-Cañas)  
**Gir.-Cañas**

***Schwartzia costaricensis* (Gilg) Bedell**

Sin.: *Norantea costaricensis* Gilg  
 Ref.: P. Allen 3510 (G, MO, NY, G, P, S).  
 500-2500 metros de altitud.  
 Países: Costa Rica y Panamá.

*Schwartzia diaz-piedrahitae* Gir.-Cañas  
 = *Pseudosarcopera diaz-piedrahitae* (Gir.-Cañas)  
**Gir.-Cañas**

*Schwartzia foreroi* de Roon & Bedell  
 = *Schwartzia chocoensis* Gir.-Cañas

***Schwartzia geniculatiflora* Gir.-Cañas & Fiaschi**

Ref.: W. W. Thomas et al. 11029 (CEPEC, COL, NY).  
 0-500 metros de altitud.  
 País: Brasil (endémica).

*Schwartzia glabra* Vell.  
 = *Schwartzia brasiliensis* (Choisy) Bedell ex Gir.-  
**Cañas**

***Schwartzia jimenezii* (Standl.) Bedell**

Sin.: *Norantea jimenezii* (Standl.) de Roon, *Ruyschia jimenezii* Standl.  
 Ref.: A. Estrada 603 (CR, F, MO).  
 1000-2000 metros de altitud.  
 País: Costa Rica (endémica).

Nota: esta especie fue citada para Panamá (Correa et al., 2004), con base en especímenes mal determinados.

***Schwartzia jucuensis* Gir.-Cañas**

Ref.: G. Hatschbach et al. 59728 (CEPEC, US).  
 0-500 metros de altitud.  
 País: Brasil (endémica).

***Schwartzia lozaniana* Gir.-Cañas**

Sin.: *Schwartzia venusta* Bedell (*in sched.*), *Schwartzia venusta* de Roon & Bedell (*in sched.*).  
 Ref.: J. Luteyn 6880 (COL, MO, NY).  
 500-2000 metros de altitud.  
 Países: Colombia y Ecuador.

***Schwartzia magnifica* (Gilg) Bedell**

Sin.: *Norantea magnifica* Gilg  
 Ref.: P. Núñez et al. 23484 (NY, US).  
 2000-2500 metros de altitud.  
 País: Perú (endémica).

*Schwartzia micradenia* de Roon & Bedell (*in sched.*)  
 = *Schwartzia renvoizei* Gir.-Cañas

*Schwartzia mutisii* de Roon & Bedell (*in sched.*)  
 Nota: este binomio no ha sido publicado, pero aparece citado en la base de datos del herbario US -basado en el espécimen *Mutis 4455* (recolectado en territorio colombiano)-, pero hasta el presente dicho ejemplar no ha sido localizado.

***Schwartzia parrae* Gir.-Cañas**

Ref.: R. Callejas 7957 (HUA, MO, NY).  
 1000-2000 metros de altitud.  
 País: Colombia (endémica).

***Schwartzia petersonii* Gir.-Cañas**

Ref.: D. Canal Gallego 98 (COL).  
 1000-2500 metros de altitud.  
 País: Colombia (endémica).

***Schwartzia pterosara* de Roon & Bedell ex Gir.-  
 Cañas**

Ref.: T. B. Croat 50284 (GH, MO).  
 1500-2500 metros de altitud.  
 País: Ecuador (endémica), probablemente en Colombia y Perú.

***Schwartzia renvoizei* Gir.-Cañas**

Sin.: *Schwartzia micradenia* de Roon & Bedell (*in sched.*)  
 Ref.: J. Cuatrecasas 15456 (COL, F, US).

1000-1500 metros de altitud.  
País: Colombia (endémica).

*Schwartzia sclerophylla* de Roon & Bedell  
= *Schwartzia antioquiensis* Gir.-Cañas

***Schwartzia spiciflora* (A. L. Juss.) Bedell**

Sin.: *Ascium berteroi* Spreng., *Marcgravia spiciflora* A. L. Juss., *Norantea berteroi* (Spreng.) Don, *Norantea jussiaei* Triana & Planch., *Norantea spiciflora* (A. L. Juss.) Krug & Urb.  
Ref.: J. Steyermark 94954 (NY, VEN).

0-1500 metros de altitud.  
Países: Dominica, Guadalupe, St. Vincent, Trinidad y Tobago, y Venezuela.

***Schwartzia tarrazuensis* Hammel**

Ref.: Hammel (2006).  
500-1500 metros de altitud.  
País: Costa Rica (endémica).

*Schwartzia venusta* Bedell  
= *Schwartzia lozaniana* Gir.-Cañas  
*Schwartzia venusta* de Roon & Bedell  
= *Schwartzia lozaniana* Gir.-Cañas

***Schwartzia weddelliana* (Baill.) Bedell**

Sin.: *Marcgravia peduncularis* Poepp. ex Rusby, *Norantea macrostoma* Gilg, *Norantea sandiensis* Gilg, *Norantea weddelliana* Baill.

Ref.: J. Solomon & M. Uehling 12250 (MO, NY, SI).  
500-2000 metros de altitud.  
Países: Bolivia y Perú.

Nota: especie citada para Colombia por Schultes (1951: 404, sub *Norantea sandiensis* Gilg), pero el registro está basado en material mal determinado; también fue citada para Costa Rica (Hammel *et al.*, 2007), pero esta especie es exclusiva de Bolivia y Perú.

***Souroubea* Aubl.**

Sin.: *Logania* J. F. Gmel., *Loghania* Scop., *Surubea* J. St.-Hil.  
20 especies.

*Souroubea amazonica* Delpino  
= ¿*Souroubea guianensis* Aubl.?

*Souroubea aubletii* G. Mey.  
= *Souroubea guianensis* Aubl.

*Souroubea auriculata* Delpino  
= *Souroubea guianensis* Aubl.

*Souroubea bahiensis* Delpino  
= ¿*Souroubea guianensis* Aubl.?

*Souroubea belizensis* Lundell  
= *Souroubea gilgii* V. A. Richt.

***Souroubea bicolor* (Benth.) de Roon**

Sin.: *Ruyschia bicolor* Benth., *Souroubea guianensis* Aubl. var. *bicolor* (Benth.) Wittm.  
Ref.: D. Giraldo-Cañas 5002 (COL).  
0-2000 metros de altitud.  
Países: Colombia y Ecuador.

***Souroubea brachystachya* Rusby**

Sin.: *Norantea brachystachya* (Rusby) de Roon  
Ref.: R. S. Williams 1461 (BM, NY).  
Sin datos de altitud.  
Países: Bolivia (endémica).

Nota: el estatus de la especie es dudoso, pero sin duda el tipo corresponde a un representante del género *Souroubea* (Giraldo-Cañas, 2011).

*Souroubea carcerea* Standl. & L. O. Williams  
= *Souroubea exauriculata* Delpino

***Souroubea corallina* (Mart.) de Roon**

Sin.: *Ruyschia corallina* Mart., *Souroubea guianensis* Aubl. var. *corallina* (Mart.) Wittm.  
Ref.: D. Giraldo-Cañas 4561 (COL).  
0-1000 metros de altitud.  
Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

***Souroubea crassipes* (Triana & Planch.) Wittm.**

Sin.: *Ruyschia crassipes* Triana & Planch.  
Ref.: J. Betancur 11054 (COL).  
1000-2000 metros de altitud.  
Países: Colombia y Venezuela.

*Souroubea crassipes* (Triana & Planch.) Wittm. var. *didyma* Poepp. ex Wittm.  
= *Souroubea didyma* (Poepp. ex Wittm.) Gilg



***Souroubea crassipetala* de Roon**

Ref.: R. E. Schultes 16912 (COL, US).  
0-500 metros de altitud.  
Países: Brasil, Colombia y Perú.

***Souroubea dasystachya* Gilg & Werderm.**

Ref.: J. Duque-Jaramillo 2038 (COL).  
0-1000 metros de altitud.  
Países: Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana (Funk *et al.*, 2007), Perú y Venezuela.

***Souroubea didyma* (Poepp. Ex Wittm.) Gilg**

Sin.: *Souroubea crassipes* (Triana & Planch.) Wittm.  
Var. *didyma* Poepp. Ex Wittm., *Souroubea suaveolens* Gilg  
Ref.: León & Monsalve (2006).  
1500-2500 metros de altitud.  
País: Perú (endémica).

***Souroubea exauriculata* Delpino**

Sin.: *Ruyschia mexicana* Baillon, *Souroubea carcerea* Standl. & L. O. Williams, *Souroubea jinotegensis* Standl. & L. O. Williams, *Souroubea puberula* Standl. & Steyerem.  
Ref.: J. Fay *et al.*, 779 (COL).  
0-2000 metros de altitud.  
Países: Guatemala, Honduras, México y Nicaragua (probablemente se le encuentre en Belice).

***Souroubea fragilis* de Roon**

Ref.: M. Bang 2401 (MO).  
0-3000 metros de altitud  
Países: Bolivia, Colombia y Perú.

***Souroubea gilgii* V. A. Richt.**

Sin.: *Souroubea belizensis* Lundell  
Ref.: Balick *et al.* (2000), Lens *et al.* (2005), Hammel *et al.* (2007).  
0-1000 metros de altitud.  
Países: Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

***Souroubea guianensis* Aubl.**

Sin.: *Loghania pentacrina* Scop., *Ruyschia guianensis* (Aubl.) Vitman, *Ruyschia lepidota* Miq., *Ruyschia souroubea* Sw., *Souroubea aubletii* G. Mey., *Souroubea auriculata* Delpino, *Souroubea guianensis* Aubl.

var. *cylindrica* Wittm., *Souroubea guianensis* Aubl.  
var. *tomentella* Steyerem., *Souroubea lepidota* (Miq.) Delpino,

Ref.: D. Giraldo-Cañas 4574 (COL).  
0-1500 metros de altitud.

Países: Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Venezuela (posiblemente en el Perú).

*Souroubea guianensis* Aubl. var. *bicolor* (Benth.) Wittm.

= ***Souroubea bicolor* (Benth.) de Roon**

*Souroubea guianensis* Aubl. var. *corallina* (Mart.) Wittm.

= ***Souroubea corallina* (Mart.) de Roon**

*Souroubea guianensis* Aubl. var. *cylindrica* Wittm.  
= ***Souroubea guianensis* Aubl.**

*Souroubea guianensis* Aubl. var. *dilatata* (Triana & Planch.) Wittm.

= ***Souroubea sympetala* Gilg**

*Souroubea guianensis* Aubl. var. *spectabilis* Wittm.  
= ***Souroubea sympetala* Gilg**

*Souroubea guianensis* Aubl. var. *tomentella* Steyerem.  
= ***Souroubea guianensis* Aubl.**

***Souroubea intermedia* de Roon**

Ref.: E. P. Killip 39146 (COL, F, MO, US).  
0-1500 metros de altitud.  
País: Colombia (endémica).

*Souroubea jinotegensis* Standl. & L. O. Williams  
= ***Souroubea exauriculata* Delpino**

*Souroubea lepidota* (Miq.) Delpino  
= ***Souroubea guianensis* Aubl.**

***Souroubea loczyi* (V. A. Richt.) de Roon**

Sin.: *Norantea loczyi* V. A. Richt., *Souroubea micrantha* Standl. & Steyerem., *Souroubea triandra* Lundell  
Ref.: G. Herrera 715 (COL, CR, MO).  
0-2500 metros de altitud.

Países: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.

*Souroubea micrantha* Standl. & Steyerl.  
= ***Souroubea loczyi* (V. A. Richt.) de Roon**

***Souroubea pachyphylla* Gilg**  
Ref.: Brako y Zarucchi (1993).  
1000-2000 metros de altitud.  
Países: Ecuador y Perú.

***Souroubea peruviana* Gilg**  
Ref.: Brako y Zarucchi (1993), León y Monsalve (2006).  
0-1000 metros de altitud.  
País: Perú (endémica).

*Souroubea pileata* Delpino  
= ***Ruyschia pilophora* Triana & Planch.**

*Souroubea pilophora* (Triana & Planch.) Wittm.  
= ***Ruyschia pilophora* Triana & Planch.**

***Souroubea platyadenia* (Gilg) de Roon**  
Sin.: *Ruyschia platyadenia* Gilg  
Ref.: de Roon (2005) y Castro Souza (2010).  
Sin datos de altitud.  
País: Brasil (endémica).

*Souroubea puberula* Standl. & Steyerl.  
= ***Souroubea exauriculata* Delpino**

*Souroubea spitziana* Delpino  
= ¿***Souroubea guianensis* Aubl.?**

***Souroubea stichadenia* de Roon**  
Ref.: Krukoff 11037 (MO, no visto; fuente: <http://www.tropicos.org/Name/19800137>).  
500-1500 metros de altitud.

Países: Bolivia y Perú.  
*Souroubea suaveolens* Gilg  
= ***Souroubea didyma* (Poepp. ex Wittm.) Gilg**

***Souroubea sympetala* Gilg**  
Sin.: *Ruyschia amazonica* Mart. var. *dilatata* Triana & Planch., *Souroubea guianensis* Aubl. var. *dilatata* (Triana & Planch.) Wittm., *Souroubea guianensis* Aubl. var. *spectabilis* Wittm.  
Ref.: D. Giraldo-Cañas 3307 (COL).  
0-2000 metros de altitud.  
Países: Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela.

*Souroubea triandra* Lundell  
= ***Souroubea loczyi* (V. A. Richt.) de Roon**

***Souroubea vallicola* Woodson ex de Roon**  
Ref.: M. D. Correa et al. 1869 (COL).  
0-1000 metros de altitud.  
Países: Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá.

***Souroubea venosa* Schery**  
Ref.: S. Castroviejo et al. 16515-SC (COL, MA).  
0-1000 metros de altitud  
Países: Costa Rica y Panamá.

*Surubea* J. St.-Hil.  
= ***Souroubea* Aubl.**

*Vargasia* Ernst  
= ***Ruyschia* Jacq.**

*Vargasia tremadena* Ernst  
= ***Ruyschia tremadena* (Ernst) Lundell**

*Vargasia viridiflora* Ernst  
Nota: quizás sea un sinónimo de *Ruyschia tremadena* (Ernst) Lundell



Giraldo-Cañas

Circunscripción morfológica, diversidad, patrones de distribución y catálogo de la familia neotropical Marcgraviaceae (Ericales) - Anexo 1

Diego Giraldo-Cañas  
Universidad Nacional de Colombia,  
Instituto de Ciencias Naturales  
Bogotá, Colombia  
*dagiraldoc@unal.edu.co*

**Anexo 1.** Catálogo de la familia neotropical Marcgraviaceae (8 géneros, 136 especies).

Circunscripción morfológica, diversidad, patrones de distribución y catálogo de la familia neotropical Marcgraviaceae (Ericales)

**Citación del artículo:** Giraldo-Cañas, D. (2018). Circunscripción morfológica, diversidad, patrones de distribución y catálogo de la familia neotropical Marcgraviaceae (Ericales). *Biota Colombiana*, 19(1), 49-69. DOI: 10.21068/c2018.v19n01a04.

Recibido: 02 de octubre de 2017  
Aprobado: 12 de diciembre de 2017

